

Рациональная фармакотерапия остеоартроза в фазе обострения

Термин «остеоартроз» (ОА) объединяет группу заболеваний различной этиологии, но со сходными биологическими, морфологическими и клиническими исходами, при которых в патологический процесс вовлекается не только суставной хрящ, но и весь сустав, включая субхондральную кость, связки, капсулу, синовиальную оболочку и периартикулярные мышцы. Основными клиническими симптомами ОА являются боль и деформация суставов, приводящие к функциональной недостаточности.

В основе дегенеративных дистрофических изменений при ОА лежит первичное повреждение хряща с последующей воспалительной реакцией, поэтому часто ОА называют артрозо-артритом. ОА всегда связан с деформацией костной ткани, в связи с чем его также называют остеоартритом или деформирующим артрозом. Терминологические определения – ОА, артроз, остеоартрит, деформирующий артроз – являются синонимами. Чаще всего термин «ОА» применяется для обозначения хронического прогрессирующего заболевания синовиальных суставов.

Выделяют локализованную (с поражением одного сустава) и генерализованную формы патологического процесса, который является результатом действия механических и биологических факторов, нарушающих процессы образования клеток суставного хряща и субхондральной кости. Он может быть инициирован многими факторами, включая генетические, эволюционные, метаболические и травматические.

ОА поражает все ткани синовиальных суставов. Заболевание проявляется морфологическими, биохимическими, молекулярными и биомеханическими изменениями в клетках и матриксе, которые приводят к размягчению, разволокнению, изъязвлению и уменьшению толщины суставного хряща, а также к остеосклерозу с резким утолщением и уплотнением кортикального слоя субхондральной кости, формированию остеофитов и развитию субхондральных кист. Клинически ОА проявляется артралгиями и ограничением



Норман Блэк из Билля, 10 лет, состояние ремиссии после обострения ОА и назначения Гелакана Фаст

движений, рецидивирующим синовитом, локальным воспалительным процессом в различных тканях сустава.

ОА является мультифакторным полиэтиологическим заболеванием. Три основные причины развития дегенеративно-дистрофического процесса в суставе – травма, дисплазия и воспаление.

Наиболее эффективным и безопасным фармакотерапевтическим подходом при выраженном болевом синдроме на фоне воспалительного процесса является применение препарата Гелакан Фаст, в состав которого, помимо коллагена и антиоксидантов, включен Boswellin® – натуральный противовоспалительный компонент растительного происхождения. Boswellin® улучшает кровоснабжение, восстанавливая кровеносные сосуды и создавая дополнительную циркуляцию, обеспечивая адекватное кровоснабжение в пораженных суставах. Применение Гелакана Фаст купирует болевой синдром и оказывает выраженное противовоспалительное действие, значительно улучшая кли-

ническую картину заболевания и качество жизни. В отличие от традиционных НПВС препарат обладает благоприятным профилем безопасности, не оказывая отрицательного воздействия на ЖКТ, и может быть рекомендован для длительного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

В № 4 2011 года российского издания JSAP приведен клинический случай успешной фармакотерапевтической коррекции при обострении хронического ОА локтевого сустава у лабрадора-ретривера. На фоне сезонного снижения температуры наблюдалась клиническая картина обострения заболевания в виде эпизодов хромоты различной степени выраженности. После курса лечения препаратом Гелакан Фаст была отмечена устойчивая ремиссия со значительным улучшением клинической картины: восстановилась полноценная двигательная активность, купировались признаки воспаления. Необходимо отметить абсолютное отсутствие побочных эффектов при применении Гелакана Фаст со стороны желудочно-кишечного тракта.

Схема назначения Гелакана Фаст
Применяется внутрь. Предварительно обязательно растворить в воде! Вводить в рацион постепенно в течение 7–10 дней начиная с 1/7–1/10 суточной дозы. Давать ежедневно с привычным для собаки кормом. Минимальный рекомендуемый курс применения – 2 месяца. Курс рекомендуется повторять 2–3 раза в год. При необходимости возможно непрерывное применение.

Состав препарата (1 кг)	
Коллаген СНР	900 г
Boswellin®	86,7 г
Витамин С	4332 мг
Витамин Е	3467 мг
Селен	3467 мкг